



W sierpniu 2008 roku Amerykańskie Towarzystwo Edukatorów Diabetologicznych (AADE) opublikowało wyniki raportu na temat terapii z użyciem zastrzyków. Raport został opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 502 osób cierpiących na cukrzycę i wymagających podawania insuliny w formie zastrzyków oraz 301 lekarzy leczących ludzi cierpiących na cukrzycę wymagających podawania insuliny, w tym 101 lekarzy pierwszego kontaktu, 100 endokrynologów i 100 lekarzy upowszechniających wiedzę o cukrzycy.

# Fakty na temat ktucia


Jedna trzecia (33%) pacjentów, których terapia cukrzycowa polega na przyjmowaniu zastrzyków insuliny, boi się tych zastrzyków.



Czterdzieści siedem procent (47%) pacjentów, których terapia cukrzycowa polega na przyjmowaniu zastrzyków insuliny, z większym prawdopodobieństwem robiłoby sobie zastrzyki regularnie, gdyby był dostępny produkt łagodzący ból i dyskomfort związane z zastrzykami.



Osiemdziesiąt trzy procent (83%) pacjentów, których terapia cukrzycowa polega na przyjmowaniu zastrzyków insuliny, chciałoby ograniczyć liczbę zastrzyków, które muszą sobie codziennie robić.



Źródło: [www.slodkiezycie.pl](http://www.slodkiezycie.pl)